

醫心方卷第九

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治欬嗽方第一

ハナキ
永東三音

治小氣方第四

治痰飲方第七

治宿食不消方第十

治喘息方第二

ハナキ
充安及

治氣壅方第五

治癰食方第八

治寒食不食方第十一

治短氣方第三

治黃疸方第六

治胃反吐食方第九

治上熱下冷不食方第十二

醫心方卷第九

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治欬嗽方第一

治喘息方第二

治短氣方第三

治小氣方第四

治氣壅方第五

治黃化方第六

治痰飲方第七

治癰食方第八

治胃反食方第九

治宿食不消方第十

治寒冷不食方第十一

治上熱下冷不食方第十二

治穀勞欲吐方第十三

治惡心方第十四

治意酢方第十五

治嘔吐方第十六

治干嘔方第十七

治噎方第十八

治欬嗽方第一

病源論云欬嗽者肺感於寒微者則成欬嗽也肺主氣合

於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六府為表

裏皆稟氣於肺以口時更至五藏六府皆有欬嗽各以其時

感於寒而受病故欬嗽形證不同五藏之欬者乘秋則肺

先受之肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血乘夏則心受之

又物塞心欬之狀則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則受

肺之肺欬之狀則兩脇下痛甚則不可以轉兩腳下滿乘至

陰則脾受之脾欬之狀欬則右脇下痛痛引於臍背甚

則不可動則欬乘冬則腎受之腎欬之狀欬則腰背相引

而痛甚則欬逆此五藏之欬也五藏欬久不已傳與六府脾欬

不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔甚則長出肝欬不已

則膽受之膽欬之狀嘔膽汁肝欬不已大腸受之大腸欬

之狀欬而遺屎心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣

者與欬俱腎欬不已膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺尿久欬

於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆

而痛甚見其氣逆山五藏之氣也五藏氣久不巳停集於肝脾

不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔其則長出肝欬不已

則膽受之膽欬之狀嘔膽汁時欬不已大腸受之太腸欬

之狀欬而遺屎心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣

者與欬俱腎欬不已膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺尿久欬

於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也

千金方云問云欬病有十何謂師曰有風欬有寒欬有支

欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有

厥陰欬問曰早欬之語目欬言不證以何為異師曰

欬語目欬言不得竟謂之風欬欬冷食寒日之而

欬謂之寒欬心下腎滿欬則引痛其脈又遲謂之

支欬引脇下痛謂之肝欬而吐血引手少陰謂

之心欬如涎出漬沫下引少腹謂之脾欬引頸項

而唾涎沫謂之肺欬而耳無所聞引腰脊謂之腎欬

而引口中頭痛口苦謂之膽欬而引舌本謂之厥

陰欬

傳陳方云欬欬要粘而如絲欬要清澄如水聲門

方云夫酒客欬者其人必吐血此為坐極飲過度所致難療

推要方云此病有數種有冷熱欬有肺萎欬有肺癰

欬有水氣欬若有本性非熱遇諸冷緣而得欬觸冷

便發熱即可此是冷欬也若有本性非冷遇諸熱緣

而得欬觸熱便發遇冷即可此是熱欬也若本性寒

又久熱將息更劇冷將息無効每唾無多濃痰

但唾白而稠物是細小泥沫此是肺萎嗽也若本性

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

推要方云此病有數種有冷熱欬有肺萎賴有肺癰

嗽有水氣賴若有本性非熱遇諸冷緣而得賴觸冷

便發熱遇即可此是冷賴也若有本性非冷遇諸熱緣

而得賴觸熱便發遇冷即可此是熱賴也若本性變熱

又久熱將息更劇冷將息無効每唾無多濃淡薄

但唾白而稠物是細小泥沫此是肺萎嗽也若本性

冷熱將息無効每賴所出時是濃淡如膿中膿或寒

或熱此是肺癰熱也若有非冷熱非經久患賴上氣喘

息腹滿悶甚者頭面有氣過久重者身體皆腫此是水

氣賴也葛氏方云上氣喘賴肩息不得卧手足逆冷

及面浮腫者死僧深方紫莞丸治咳上氣喘息多唾

方紫莞一名黃白細辛一名橘皮干薑各三兩各五物

丸如梧子三九先食服日三又方如櫻桃大含丸稍咽其

汁日三新久咳晝夜不得卧以水雞聲欬死者治之甚良

今案者要方為散白飲服一方寸匕錄驗方小紫莞丸治上氣夜咳逆多濁白

方干薑二兩一名橘皮細辛二兩紫莞三分

類冬花二兩附子二兩凡六物下篩蜜和丸如梧子

先食服五九日二先

大紫莞丸治上氣欬逆方紫莞二兩五味子二兩

橘皮二兩一名橘皮香豉二兩干薑二兩桂心二兩杏人二兩

細辛二兩甘草二兩一名橘皮食茱萸二兩

凡十一物搗篩蜜和丸如梧子一服五九日二夜冷一丸如杏

核大咽汁晝更含並祖方治上氣咳東杏人丸方

杏人一升一名橘皮干薑二兩細辛二兩紫莞二兩桂心二兩

搗下篩杏人別如脂合和以蜜丸服如棗核一枚日三廣

濟方療咽喉乾燥欬語無聲桂心散方

糖皮二兩 香豉二兩 干薑二兩 桂心二兩 杏仁二兩

細辛二兩 甘草二兩 細辛二兩 紫菀二兩 桂心二兩

凡十一物 搗篩蜜和丸如梧子一服五九日二夜冷一丸如杏

核大咽汁盡更含 垂祖方治上氣咳東杏人丸方

杏人一升 干薑二兩 細辛二兩 紫菀二兩 桂心二兩

搗下篩杏人別如脂合和以蜜丸服如棗核一枚日三廣

渚方療咽喉乾燥欬賴語無聲桂心散方

桂心六兩 杏人三兩 搗篩以綿裹一乘大含細咽汁日

三夜二忌生葱油膩 范汪方治欬紫菀牙上丸方

紫菀一升 乾薑一升 附子一升 桂心一升 細辛一升

細辛一升 凡六物治獲和蜜丸 如小豆先食以二瓦著牙

上稍目日弄不知稍增 又云授杯湯治欬上氣胸中寒

冷不能得食飲卧不安床牽繩而起咽中如水雞聲方

東花廿枚 細辛一兩 紫菀二兩 甘草二兩 桂心二兩

五味半升 杏人枚半反半升 桂心二兩 麻黃

寒溫再服溫卧汗出即愈 三兩杏人百枚凡三物切以

水六升煮取二升 五合未食久三服

小品方治欬嗽上氣呼吸攀繩肩息欲死霞杯湯方

麻黃四兩 甘草二兩 干薑二兩 桂肉二兩 貝母二兩

凡五物以水八升煮取二升再服即愈 今案范汪方云

上氣喘急欲死服之與五葉湯不差苗與合此霞林 又云汶雪

湯治上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲絕方麻黃雨

細辛二兩 五味子半升 干薑四兩 桂心二兩 凡六物

以水一斗煮取三升分服一升授杯即得卧一名授杯湯令

得汗多毒不得眠汗者一服消息後服 今案范汪方云

得汗多毒不得眠汗者一服消息後服 今案范汪方云

見母 麻黃湯 甘草二兩 干薑二兩 今案范汪云 葛根湯 葛根二兩 麻黃二兩 杏仁五十粒 芍藥二兩 桂枝二兩 甘草二兩 水一斗 煮取三升 分三服 汗出即愈 上氣喘急 欲死 服之 與 桑葉湯 不若 葛根湯 此 覆杯 湯 兒 不能 飲 母 稍 含 之一 夜 至 明 盡 得 愈 又云 汶雪

湯治上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲絕方麻黃湯 細辛二兩 五味子半升 干薑四兩 半夏四兩 桂心二兩 凡六物 以水一斗煮取三升分服一升投杯即得卧一名投杯湯令

得汗多毒不得眠汗者一服消息後服 今案經心方云麻黃湯 五味半升 桂心三兩 杏仁 三兩 細辛三兩 生薑四兩 半夏四兩 七物以水 一斗煮取三升分三服 乘可五合 服漸 千金方云夫陷客

欬者必致吐血坐極饑過勞所致厚朴大黃湯主之厚朴 一尺大黃六兩 枳實四兩 三味水五升煮取二升分再服之 本草云欬逆厥髓以酒服之甚良 又方鴉三膏酒和

三合服之白三 又方食鯉魚肉也 孟詵食經云 療卒咳末方 梨一顆剉作五孔每孔 中內一粒以通果棧於灰中燒令極熟出停冷剉食

之 今案極要方梨七果取汁白錫一兩 又方梨去核內蘗蜜麵 裹燒令熟食之太良 又方割梨肉於蘗蘗中煎之停冷 食之 今案宋 醫方 食經云凡用梨治 實皆須待冷食之與食及成類 葛氏方治卒得欬末方

皂莢 干薑 桂心 分小枳丸服三九日三 又方生薑汁百部汁 和薑服二合 集驗方治忽暴氣束奔喘生卧不得并 喉裏聲氣欲絕方 麻黃三兩 杏仁四兩 干薑 紫胡四兩 橘皮二兩 切以水六升煮取三升半

分三服 張仲景方治年欬大棗丸方 大棗百枚 杏人 百枚 致百枚 凡三物豎杏人枳令相得乃內棗枳令乾 和調丸如棗核一丸含之稍咽汁日二漸增之常用良 者此方治年久東方 細辛紫莞 麻黃 甘草 干薑

五味為散白飲服一方寸匕日三 各四

紫胡四兩 橘皮二兩 切以水六升煮取二升半

張仲景方治卅年欬大棗丸方 大棗百枚 杏人

百枚 欬百枚 凡三物取杏人相得乃內棗相令乾

和調丸如棗核一丸含之稍咽汁日二漸增之常用良

者必方治卅年欬東方 細辛紫莞 麻黃甘草干薑

五味為散白飲服一方寸匕日三

効驗方類冬花今丸治卅年欬上氣欬逆面腫方杏人

干薑三兩 甘草二兩 乾薑

花二兩 凡六物治下肺以蜜和丸如梧子先食服三丸日三

僧深方治新久欬花煎方花煎二兩 乾薑二兩

白蜜二升 凡三物內於蜜中微火煎服如棗核一枚日三

董欬束法 錄鈴方治久欬動法 蠟紙一張熟艾薄

布遍紙上動黃末一兩 欬束花末二升 前遍布艾上著一

華筒卷之寸列以繩繫之燒下頭欬烟取三寸烟亦

可吐咽欬計差欬盡刮一百日斷 壺及罪 今案本草

千食方治欬黃法 細熟艾薄 布紙上廣四寸復以黃

末薄布艾上欬令調以荻杖如紙長卷之截作十枚先

以燒紙下去欬烟從孔出口取烟之取去心明日復重作

日餘者後日復重之三日心自然差得食白糜餘皆禁之

灸欬束法

僧深方云灸通乳下黑白密際灸百壯 即日愈

又方以繩當乳 圍周身令前後平正當乳脊

骨解中灸之九十壯 又方橫度口中折繩從脊灸繩兩

邊灸八十壯三百報畢 又方從大椎數下行第五節下

第六節上穴間中一處灸隨年壯并治上氣秘方 小品方云

灸欬嗽法

日餘者後日復薰之三日必自然差得食白糜餘皆禁之

僧深方云灸通乳下黑白密際文百壯即日愈

又方以繩當乳^{方同}圍周身令前後手正當乳脊

骨解中灸之九十壯又方橫度口中析繩從脊灸繩兩

邊灸八十壯三百報畢又方從大椎數下行第五節下

第六節上穴間中一處灸隨年壯并治上氣秘方小品方云

灸肩井穴百壯在肩上陷解中大脊前又方灸大柁穴

隨年壯在項第一椎下兩旁各一寸半陷者中又方灸

肺愈隨年壯在第三椎下兩旁各一寸半又方灸風門熱

府穴百壯在第二椎下兩旁各一寸半又方灸天突

穴五十壯在結喉下五寸宛中又方灸璽堂穴百壯在紫宮

下一寸六分又方灸璽堂中穴五十壯在玉堂下一寸六分兩乳間陷者

中又方灸雲門穴五十壯在巨骨下氣戶兩旁各一寸陷者中

橫去旋旁六寸又方灸中府穴五十壯肺募也在雲門下一寸

又方灸巨闕穴五十壯在鳩尾穴下五分又方灸期門穴五十

壯在者巨闕五寸奉臂取之

各二寸又方灸或中穴在輔府下一寸六分又方灸氣戶穴在

去旋機旁各四寸

葛氏方云度手母指中折以度心下灸三壯即差

治喘息方第二

病源論云肺主氣耶垂於肺則胎脹則肺管不利也則

氣道溢故氣上喘逆鳥息不通也葛氏方治卒上氣

鳥息便欬飽方搗蓬莖飲汁一升許立愈又方未人恭服

方寸匕日三又方桑根白皮細切三升生薑切半升吳茱萸

半升酒五升合煮三沸去滓盡服之入口則氣下此千金秘

此下一寸
為鳩尾
骨下
更取五分
為鳩尾

治喘息方第二

病源論云肺主氣耶垂於肺則胎脹則肺管不利也則

氣道溢故氣上喘逆鳥息不通也葛氏方治平上氣

鳥息便欬飽方 搗蓬莖飲汁一升許立愈又方未人參服

方可日三又方桑根白皮細切三升生薑切半升吳茱萸

半升酒五升合煮三沸去滓盡服之入口則氣下此千金秘

方極要方療上氣之逆滿喘息不通字及欬死救命湯方

麻黃八兩 甘草四兩 大棗卅枚 夜干如博子三枚右以井

花水一斗煮麻黃并沸內餘藥煮取四升分四服入口即愈

醫門方治上氣喘急不得卧身面腫小便澀方 亭歷

一兩 大棗卅枚 水三升煮取一升內亭歷煮五六沸

頓服微利差 効驗方遊氣湯肺上氣一乘一者元常緩

急不足不得飲食不得眠方 生薑八兩 厚朴四兩 人參二兩

茯苓四兩 桂心五兩 半夏一升 枳實子五枚 甘草二兩

黃芩三兩 凡九物切以水一斗煮取四升服七合日三

錄驗方大棗湯治上氣胃寒咽中如冰雞膺方

欬冬花卅枚 細辛四兩 桂心四兩 麻黃四兩 大棗廿枚 甘草四兩

杏仁卅枚 紫菀四兩 生薑十兩 半夏三升 十味以

水八斗煮取二斗頓服卧令汗食糜粥數日餘皆禁便愈

新錄方治上氣喉中水雞鳴方 桑根白皮一升生薑合

皮切一升以水四升煮取一升六分二服又方冷水漬之溫易之

又云上氣身面浮腫小便澀喘急不得卧方 高麗子十八 杏人

只 大棗肉五升 三物合煮三四升可丸飲服如梧子丸日二

加至十九以小便為度此方大安穩兼去水腫滿者又方以桑根

汁一斗煮赤小豆三升豆熟散豆飲汁又方大豆三升以水一斗

新錄方治上氣喉中水雞鳴方 桑根白皮一升生薑合

皮切一升以水四升煮取一升六分二服 又方冷水漬之溫易之

又云上氣身面浮腫小便澀急息不得卧方 高麗子十八 杏仁

只 大棗肉五分 三物合搗三四千杵可丸飲服如梧子七九日二

加至十九以小便為度此方大安穩兼去水腫滿者 又方以桑根

汁一斗煮赤小豆三升豆熟散豆飲汁 又方大豆三升以水一斗

煮取五升去滓內桑根白皮切一升煮取一升六合二服腫頓

消當利三行 又方以水一斗研麻子三升取煮赤小豆三

升豆熟散豆飲汁 又云之氣喘急方 桃人杏皮一升搗為

泥分以酒若湯服之

治短氣方第三

病源論云短氣者平人无寒熱短氣不足以息者體實也實

則氣盛則氣逆不通故短氣也 又肺虛則少氣不足也

令短氣則其人氣微常如少氣不足以呼吸也

僧深方治短氣欲絕不足以息煩燒養氣心煩竹根湯方

竹根一斤麥門冬一升甘草二兩大棗十枚粳米一升小麥一升

凡六物水一斗煮麥米熟去之內藥煮取二升七合服八合日三

不能飲以綿滴口中 醫門方治胸中痞塞短氣喘者

或腹急痛方 伏苓四兩 甘草二兩 半夏三兩

生薑三兩 杏仁百顆 水七升煮取二升半去滓分溫三服

相去八九里泄氣寒若氣不下加大黃檳榔人取利為佳

千金方治短氣不得語方 艾子二十七枚豉七合 水二升煮豉

取一升半去豉內艾子煮取八合服半升 又云平短氣者方

鳩薤取汁服一升立愈 又云冷熱短方 枳五兩 縮袋咸

酒一升漬三七日服之任性

或患急痛方

伏苓四兩

甘草二兩

半夏三兩

生薑三兩 杏仁百顆

水七升煮取二升半去滓分溫三服

相去八九里泄氣寒若氣不下加大黃檳榔人取利為佳

千金方治短氣不得語方 艾子二十七枚豉七合 水二升煮豉

取一升半去豉內艾子煮取八合服半升又云平短氣者方

枳實取汁服一升立愈又云冷熱短方 枳五兩 縮袋盛

酒一升漬三七日服之任性

治少氣方第四

病源論云少氣者此由藏氣不足故也肺主氣而通呼吸藏

氣不足呼吸微弱而少氣也胸痛少氣者水在藏府之故也

水者陰氣也陰氣在內故少氣也 廣濟方療腹冷氣不

能食及少氣調中丸方 人參五兩 伏苓五兩 甘草五兩

白朮五兩 干薑四兩 枳實蜜和為丸空腹溫酒服如梧子

廿九日二夜一有益盡更令不飲酒煮大棗飲下不利忌

海藻 桃米酢 千金方治之氣方 為杞葉二兩 生薑

二兩以水三升煮取一升服 葛氏方治卒乏氣不復

報肩息方 干薑三升艾咀以酒一升漬之服一升日三

又方度手母指折度心下灸三壯即差 又方麻黃三兩

先以水五升煮一沸去沫乃內甘草二兩杏仁六十枚煮

取二升半三服

治氣壅方第五

病源論云氣壅由陰陽不和藏氣不理寒氣積於胸

掌故氣有阻塞不通而謂之氣壅令人喘博胃背痛

也又云壅者一日氣壅二日憂壅三日食壅四日勞壅五日

思壅雖有五名皆由陰陽不和三焦障絕津液不行

憂患真怒所主所主所以謂之五壅者壅塞不通也

治氣壅方第五

病源論云氣壅由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸
掌故氣有阻塞不通而謂之氣壅令人喘悸胃背痛

也又云壅者一日氣壅二日憂壅三日食壅四日勞壅五日
思壅雅有五名皆由陰陽不和三焦障絕津液不行

憂患真怒所生所生所以謂之五壅者壅塞不通也

新錄方治氣壅胸塞不達方 水脹壅末一大匙又方合

咽羨酒取老口酢之得又方蘓蜜合桑令相得細之合咽

之又方鳩韭取汁脹五合又方灸臍中穴又方灸第五

椎又灸內踝上三寸

集驗方通氣壅湯方半夏八兩 桂心三兩 生薑八兩

凡三兩物以水八升煮取三升服半升日二

千金方治壅氣不達永不得食方 杏仁三兩 桂心三兩

二味丸如棗核稍咽之臨食先含弥佳極要方

治責氣方第六

病源論云夫責氣者腎之積氣也起於發怒思憂患所起

若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷

動氣積於腎而氣上下遊走如狂之責故云責氣其氣

乘心若心中踊如車所發如人所恐五藏不安食飲輒噎

氣滿胸中狂癡不定妄言見此發驚恐責氣之狀也若氣

滿文心下煩亂不欲聞人聲休休有時乍若乍劇及短

氣手足厥逆內煩結痛溫之欲區此憂思責氣之狀也

醫門方云論曰奔狂病者從少腹起上衝喉咽發作時歇

死皆從驚得之療奔狂氣方

生葛根廿分 甘李根白皮切一升 水九升煮三升分溫三服

氣滿胸中狂癡不定妄言見此驚恐責我之狀也若氣

滿文心下煩亂不欲聞人聲休作有時乍驚乍劇吸短

氣手足厥逆心煩結痛溫之欲區此憂思責我之狀也

腎門方云論曰奔我病者從少腹起上衝喉咽發作時歇

死皆從驚得之療奔我氣方

生葛根シロネ分 甘李根シロ皮切シロ一升 水九升モ煮三升取分溫三服ヤリ

相去八九里療奔我氣在心胸中不下支滿者方 生薑

五兩半夏オシロイ四兩洗 桂心カニニク人參カネ 薯蕷カネ 甘草オホホト 伏苓各二升

水七升煮取二升分溫三服相去八九里又云奔我法

宜灸氣海丹由開元腎當其穴灸之穴在臍下寸三寸

是也隨年灸之小品方云師曰病有奔我有吐膿有驚怖

有火灸耶此四部病皆從驚得之所言如奔我之狀者是病

人氣如我奔我氣息喘迫上逆之狀也湯方用贖猪者謂

雄壯如斗子是先逐之使奔之然後致取血及藏合藥也

葛根又作獼猴也子路獼猴說文曰牡猴也本我湯方干者葛根八兩 生李根去皮一升 人參カネ三兩木

二兩半夏ホソクミ一升洗 夕藥ヤセヤリ三兩常歸オホヤリ二兩 桂肉五兩 生薑クニツク一斤

甘草二兩凡十物以我汁二斗煮得五升溫服八合日三牡蠣オシロイ本

我湯方牡蠣三兩 桂肉八兩 李根一斤 甘草三兩 凡四物

煮我令乾取汁一斗七升煮李根得七升汁內藥取三升分

服五合日三夜再 廣洛方療責氣在胸心迫滿支寧

方生薑一斤 半夏四兩洗 桂心三兩 人參二兩 薯蕷

莢一兩 甘草二兩各以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服

忌生菜麵粘食イメナキキナミナモミ

集驗方責我伏苓湯治虛氣五歲不足寒中厥逆腹

滿氣責衝胃イメナキキナミナモミ胃氣イメナキキナミナモミ胃氣イメナキキナミナモミ

滿氣責衝胃イメナキキナミナモミ胃氣イメナキキナミナモミ胃氣イメナキキナミナモミ

煮此令熟取汁一斗七升煮李根得七升汁內藥取三升

服五合日三夜再廣洛方療賁氣在胸心迫滿文寧

方生薑一斤半夏四兩桂心三兩人參二兩黃芩

黃一兩甘草二兩各以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服

忌生菜麵粘食粘食處久俗作粘

集驗方賁氣伏苓湯治虛氣五歲不足寒中厥逆腹

滿氣賁衝胃障發作氣欲絕不識人氣力羸劣小腹起

騰踊如狂子走下方生葛八兩甘草根白皮切一升生薑

五兩伏苓四兩半夏一升人參三兩甘草三兩當歸二兩

芎藭二兩肥壯一頭卅斤者逐走令口中沫出刺取血治作

如食法以水足淹之熟煮之澄取清汁次去上肥得一

斗二升酒二升并血合煮諸藥取五升服八合日三升全方氣

治上下否塞不能休息破一氣丸方枳實三升胡桂七升

枳實十升橘皮三升干薑三升枳六升烏頭七升

人參五升桂心四升厚朴三升枳殼三升附子五升

甘草八升細辛三升亭歷四升大黃八升檳榔八升

伏苓四升前胡四升木六升防葵四升芎藭四升

當歸七升吳茱萸六升茵陳九升梧子酒服十九日二有

熱者空腹服之又云治氣上不得卧神秘方橘皮

生薑紫蘇人參五味子五味各等分五兩水七升

煮取三升分三服又云治氣滿腹脹下氣湯方半夏一升

生薑一升人參一兩半橘皮三兩四味切之以水七升

煮取三升分三服一日令盡

治淡飲方第七

病原論云淡飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停

在胸府者或成痰或成水其人素盛今更人更復閉塞

生薑 紫蘇 人參 五味子 五苓各等分 五兩 水七升

米煮取三升分三服 又云治氣滿腹脹下氣湯方半夏升

生薑一升 人參一兩半 橘皮三兩 四味切之以水七升

煮取三升分三服一日令盡

治淡飲方第七

病源論云淡飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停

在胸府結而成淡又其人素盛今瘦水走腹間渡有

聲謂之淡飲其為病也胸脇脹滿水穀不消結在兩

脇水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胸

背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得卧其形如腫是也

南海傳云石室淡飲關胃中垂數臍流清水釋

糧穀津咽開戶滿膺喉語聲不轉飲食不化動歷一旬如此之

下米咸流飽食便寒勞冬頂無假據咽斯乃不泔湯藥

而能蠲疾即醫明之大規矣氣不得卧其形如腫

是也

千金方云夫飲有四其人素盛今瘦水走腸間泄

有聲謂之淡飲下後水流在脇下欬藥引痛謂

之懸飲水行歸於四支當汗出而不汗出身體重謂

之溢飲其人欬倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲

淡飲者當以藥和之懸飲者干姜湯主之甘草四兩

大棗廿枚干薑二兩三味水一斗煮取二升分三服

者青龍湯主之麻黃六兩桂枝二兩甘草二兩

石膏二兩杏仁廿枚大棗十枚生薑二兩凡七物以水九升

煮麻黃減二升乃內餘藥得二升去滓服一升溫覆令汗

出多者溫粉之汗止勿復服

支飲者本防已湯主之本防已三兩石膏雞子大十二枚

淡飲者當以藥和之。懸飲者干棗湯主之。甘草四兩

大棗廿枚 干薑二兩 三味水一斗煮取二升分三服。後飲

者青龍湯主之。麻黃六兩 桂二兩 甘草二兩

石膏二兩 杏仁廿枚 大棗十枚 生薑二兩 凡七物以水九升

煮麻黃減二升乃內餘藥得二升去滓服一升溫覆令汗

出多者溫粉之汗止勿復服

又飲者木防己湯主之。木防己三兩 石膏雞子大十二枚

桂心二兩 人參四兩 四味水六升煮取二升分再服。又云

伏苓湯主胸中澹滿方。伏苓四兩 半夏一兩 生薑二

升 桂心八兩 四味水六升煮取二升半分四服。又云治卒

頭痛如破非寒又非中惡其病是胸中澹飲二三升

許通身暖飲二升須臾極吐止畢又飲如此數過刻

者須臾臆乃止不損人。又云冬留飲冷癖法。灸通

谷穴五十壯在幽門下一寸幽門在巨關旁半寸。錄驗方

治胸中澹飲食散在日併吐。出方單服生薑汁一升

飲吐止之不止吐自向下出。葛氏方治胸中多痰頭

痛不欲食及飲酒人乘僻道澹方。恒山二兩 甘草

一兩 松蘿十兩 蒺藜三七枚以酒水各一升半煮

取升半初服七合取吐不盡餘更分二服後可服半

夏湯。又方先作一升湯投一升水名為吐熱湯乃食

三合塩以此易逆須臾欲吐便極吐未盡更服二合

又云若胸中常有淡冷水飲虛羸不足取吐者方

方名半夏。半夏一升洗生薑半斤 伏苓三兩水七升煮取

一升半分再服。小品方茱萸湯治胸中積冷心下淡水煩

滿任不下飲食心胸應背欲痛方。生薑三兩 半夏三兩

生薑三兩 半夏三兩 生薑三兩 半夏三兩

夏湯 又方走作一升湯投一升水名為生熟湯乃食
三合塩以此易遂須臾欲吐便極出未盡更服二合

又云若胸中常有淡冷水飲虛羸不足取吐者方
伏苓湯 半夏一升洗生薑半斤 伏苓三兩水七升煮取

一升半分再服 小品方茱萸湯治胸中積冷心下淡水煩
滿行不下飲食心胸應背欲痛方 生薑三兩 半夏三兩

桂心三兩 吳茱萸三兩 人參一兩 大棗十枚 甘草一兩
凡七物以水九升煮取三升內白蜜五合分三服 今案集驗

方生薑五兩 胡洽方治淡冷癖氣方生薑八兩附子四兩
二物以水三升煮取一升半分再服 僧深方治五飲酒癖方

木一斤桂半斤 干薑半斤三物治下節和蜜丸如梧子服
十九不稍增初服當取下先食服日再 集驗方治胸中淡

飲腹中水鳴食不消食吐水湯水大櫛榔廿 半夏
八兩 生薑四兩 杏仁四兩梔木四兩伏苓五兩橘皮三兩切水一

斗煮取三升分三服 効驗方甘草丸治酒飲方甘草二升
薇蒂一分凡二物治下節蜜丸如梧子欲下病服三九日三

丸不下增之以吐為度 又云斷草散治淡百病常
用驗方 七月七日薇蒂二枚赤小豆二兩人參二兩凡三物

治合下節以溫湯和服方寸匕當吐病愈
人參 又云斷草丸治胃中不和有水方蜀附子一分梨蘆

一升 甘草一升 赤小豆一升 凡五物治合下節蜜丸
如小豆一服五丸當吐青黃不知稍增范汪方病久飲不得

息亭歷太棗寫肺湯主之方 亭歷 大棗
廿枚以水二升煮棗令得一升半去棗肉藥一丸復煎得

一升盡服之 極要方療淡氣方 橘皮二兩煮以水三升

支飲 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其 支飲其

一云又云對真丸治胃中問有澀水方蜀附子一梨蘆

一下甘草一下赤小豆一下下瓜丁一下凡五物治合下節蜜丸

如小豆一服五丸當吐青黃不知稍增范汪方病文飲不得

息亭歷太素寫肺湯主之方亭歷自丸如淨丸太素

廿枚以水二升煮棗令得一升半去棗肉藥一丸復煎得

一升盡服之極要方療淡氣方橘皮二兩以水三升

煮取一升二合為一服間日服之新錄方治淡飲方苦楸穰

赤小豆一下楊蔞蜜丸飲服如小豆三九大佳又方瓜丁

赤小豆各一兩楊蔞蜜丸飲服如小豆七九吐淡美

治癖食方第八

病源論云夫五藏調神則營衛氣重理營衛氣重則

津液通流難復多飲水漿不能為病橘蔞市方三

雖香澤三雖不澤則腸胃不能宣行因飲水漿便令

停滯不能行更遇寒氣即聚而成癖者謂癖側在於

兩脇之間有時而痛是也通玄云絃癖之疾不專於絃

病者肝之所生癖病者脾之所成絃生於左癖成於右絃者

如弓之弦肝之所生肝與膽為清淨之府不受外邪故知自

生病也癖者脾胃為水穀之海食不消偏僻一邊故名

為癖令一絃癖同為一疾實難矣

龍門方治絃癖病腹堅如石方

取苦瓠開口盛大散醋滿中密塞口釜中煮令

極熱出瓠以熨堅處冷即更煮時即作葱豉

湯食之每熨時皆以衣觀身

極要方治癖瘕方

八分大黃一下前胡一下右以水六升煮取一升六合分溫

龍門方治絞痛病腹堅如石方

取苦瓠開口盛大散醋滿中密塞口釜中煮令
極熱出瓠以熨堅處冷即更煮一時即作葱豉
湯食之每熨時皆以衣襯身

極要方治癰瘰方

龍甲六分一名青衣白朮六分一名青衣枳殼六分一名青衣生薑

八分一名青衣前胡四分一名青衣右以水六升煮取一升六合分溫

三服忌猪魚

千金方治心淡蔭癖氣吞酸

半夏湯方 半夏三兩 生薑六兩 附子一枚 吳茱萸

三兩 四味水五升煮取二升半分三服

葛氏方治腹中冷癖水穀瘕結心下停淡雨脇痞滿

業之鳥轉蓬空飲食方 大黃三兩 甘草二兩 蜜一升二合

藥七枚以水三升煮藥取升內諸藥煮取一升七合分

再服又方伏苓一兩 茱萸三兩 蠶蜜丸如梧子服五丸三

醫門方療疔氣冷痛吐酸水或目出熱契水得

此病方水乾薑各二兩 橘皮細辛 吳茱萸各一兩 伏苓

人參各二兩半 右搗篩蜜和為丸空腹煖水下十五丸加至

廿九日二

廣利方理癰熱腹痛兩脇脹滿食少方 紫胡六分

桔梗八分 通草八分 伏苓六分 赤芍藥四下 栝李人四下

龍甲四分 切以水二大升煎取九合食後分溫三服如人行七

飯間而八里進一服忌生食人菹 廣濟方療癰結心下硬痛也豆丸方

巴豆三枚 杏仁七枚 大黃如鷄子大 搗篩蜜丸空腹以飲服如

梧七丸日一服

治胃及吐食方第九

病源論云胃及老營衛俱虛其通氣不足停水積飲在胃

龍甲カクアコウ切以水二大升煎取九合食後分溫三服如人行七

切又作メシ八里進一服忌生食人菹ナメシク廣濟方療癰結心下硬痛也豆丸方

巴豆三枚杏仁七枚大黃如雞子大搏篩蜜丸空腹以飲服如

陶景注云巴豆出巴郡
似大豆
一名巴豆
梧七丸日一服

治胃及吐食方第九

病源論云胃及老營衛俱虛其通氣不足停水積飲在胃

管則藏冷而脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也

則朝暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往來寒熱甚者食

已即吐也

醫門方云食已吐其食者胃中虛冷所致

効驗方干薑丸胃反大吐逆胸痛羸瘦不得食飲溫中

下氣使人進食方 吳茱萸二兩 小麥二兩 杏仁二兩

干薑二兩 好豉二兩 蜀椒二兩 凡六物槁下篩

和蜜丸如梧子服七九日三 葛氏方治胃反不受食之畢

輒吐出方 大黃四兩 甘草二兩 水三升煮取一升半分再服之

本草注云
陳者謂
三年五年者
三物枳實黃連合治為散以水二升半煮取三升

平沸瀝去滓汁著銅器中乃火散如雞子擘合和合頓服之

羸人再服 經心方伏苓湯治胃反而渴方 伏苓四兩 澤瀉

四兩 桂心二兩 半夏四兩 甘草二兩 五味以水一升煮取二升半服

八合日三又云治胃反食輒吐方 陽粟米令極白搏篩下作丸

楮子大熟者稍吞得下便愈 范汪治胃反不受食已飲吐

四物常歸湯方 白蜜一升 當歸二兩 人參二兩 半夏一升 凡

四物常歸湯以水二升合蜜楊百卅過內藥銅器中煎得六升分

并服加至一時復服盡又云橘皮湯治臨吐及逆食飲不下方

并服加至一時復服盡又云橘皮湯治臨吐及逆食飲不下方

四兩桂心二兩半夏四兩 甘草二兩 五味以水一斗煮取二升半服

八合日三又云治胃及食輒吐方 粳米令極白搗篩下作丸

楮子大棗者稍吞得下便愈 此汪治胃及不受食已欬云

四物常歸湯方 白蜜一升 當歸二兩 人參二兩 半夏一升 凡

四物常歸湯以水二斗合蜜楊百卅過內藥銅器中煎得六升

并服加至一時復服盡又云橋皮湯治臨吐及逆食飲不下方

人參一兩 橋皮二兩 白朮一兩 生薑三兩 甘草二兩 凡五物切

以水一斗煎取三升先食服一升日三

千金方治大虛胃及食下難便云方 人參一兩 澤瀉二兩

茯苓四兩 橋皮三兩 桂心三兩 干薑三兩 青竹茹五兩 大薑

六分 九朮水八升煮取三升服七合日三夜一已利者去者

大黃又方蘆根茅根以水四升煮取二升頓服下得

食 今案新錄方切各一升水六升 又云冬胃及食云方

冬雨乳下各一寸以卷為度 又方冬吞上一寸廿

壯又方冬胃管穴平壯在鳩脊中央 極要方療云不

得食并胃及飲逆食即云方 甘草一兩 橋皮一兩 生薑

八兩 葱白干四枚 右以水六升煮取二升半分三服不心

更作 今案廣濟方葱白十莖橋皮以 醫門方療胃及不受食云

訖臨云方 半夏人參 生薑 橋皮二兩 大棗十二枚 白

蜜五合以東流水七升煮取二升半去滓內蜜更送三百下

煎三五沸分溫三服相去八九里 救急單驗方療及胃方

鳩生葛根紋汁二升服驗 今案新錄方取六七合日二三 非治胃熱逆不下食者

又云方冬雨乳下三寸扁鵲云隨年壯華他云壯壯神驗

治宿食不消方第十

病原論云宿食不消者由五藏氣虛為寒氣在於脾胃之

蜜五合以東流水七升煮取二升半去滓內蜜更送三百下

煎三五沸分溫三服相去八九里救急單驗方瘡及胃方

鳩生葛根紋汁二升服驗今案新醫方取六七合日二三

又云方冬兩乳下三寸扁鵲云隨年壯華他云壯神驗

治宿食不消方第十

病原論云宿食不消者由五藏氣虛寒氣在於脾胃之

間故使穀不化也舊穀未消新穀又入脾胃既弱故不能磨之

則經宿而不消也令人腹氣急意氣酸鼻時復前寒

壯熱是也或頭痛如瘧之狀集驗方治凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便去宿食即差陸光錄

說有人食桃有不消作病時已晚無桃就樹間得燒桃子

燒服之登出病即差南海傳云若疑腹有宿食

又刺膺胃宜頃恣飲熱湯指剔喉中變出令盡

更飲更次以盡為度或飲冷水理亦無傷或干薑

湯斯甚妙也其日必須斷食明朝方始進食

范汪方治腹痛消穀心利服大豆方

取大豆苗擇兒好者服一合所日四五服一日中五合飯後

輒服雖非飯後可投間服趣盡四五合欲服時手按豆

令烟光明若苦堅難小減豆

范汪方治食生冷之物或寒時衣薄當風食不消或夜食以

卧不消化心腹煩痛脹急或連日不化方燒地令熱以褥席

布上卧上厚覆取汗愈新錄方治宿食不消方雞白

切一升豉一升水四升煮取二升分二服又方主薑五兩大兩鳩取汁溫

服之又方鳩絲如泥酒服如棗日三又方麴米干薑末一升酒

服一方寸匕日三又方冬大倉穴二三百壯又方冬膺左右相去

范汪方治食生冷之物或寒時衣薄當風食不消或夜食以

卧不消化心腹煩痛脹急或連日不化方燒地令熱以褥席

布上卧上厚覆取汗愈葛氏方同之新錫方治宿食不消方雞白

切一升豉一升水四升煮取二升分二服又方主薑五兩梔取汁溫

服之又方梔蘇如泥酒服如棗日三又方麴米干薑末一升酒

服一方寸匕日三又方灸大倉穴二百壯又方灸膺左右相去

三寸名魂舍並依年壯壯准多益佳又方灸第五椎并左

右相去一寸五分

錄驗方治宿食不消大便難練中丸方大黃六分亭歷子

四兩熬杏仁四兩熬芒消四兩熬凡心物下節蜜和食已服如

梧子七九日三不知稍增一名石肺入石脾

千金方消食丸主數年不能食方麥蘗一升薑四兩

烏梅四兩七月七日麴一升四味蜜和服十九日再至丸寒

在胸中及胃煩也者皆差極要方治宿食不消

心腹妨滿脹痛須利方訶梨勒皮八卜桔梗六分檳榔八分

夕藥六分大黃十八右為散空腹煮生薑飲服三錢上日

二服

葛氏方治脾胃氣弱穀不得下遂成不復受食方

大麻子人一升大豆黃卷二升并一名蘇熬令黃香梔取汁

一二方一名蘇日四五今案僧保方大麻子人三升大豆二升調中下氣調冷熱利水穀

治寒冷不食方第十一

千金方消食餅下丸寒冷者常將之方麴米一升炙麥

蘗米一升吳茱萸四兩三味蜜和服十五丸如梧子曰三

人云消食丸主數年不能食方小麦蘗一升

干薑四兩烏梅四兩麴一升四味蜜和服十九

二方七日四五二升調中下氣調冷熱利水穀

治寒冷不食方第十一

千金方消食餅下丸寒者常將之方 麴米一升炙麥

蓬米一升 吳茱萸四兩 三味蜜和服十五丸如梧子日三

次云消食丸主數年不能食方 小麦蔞一升

干薑四兩 烏梅四兩 麴一升 四味蜜和服十丸

日再至卅丸寒在胃中及胃番心者皆差

范汪方治久寒不欲飲食數十歲方 茱萸八合生薑一斤

消石一升 凡三物清酒一升水五合煮令得四升絞去滓

溫飲二升病即下去勿復服也 葛氏方治胃中虛冷不能

飲食輒不消羸瘦腹脹之四支極弱百疾自此牙生方薤白

一斤枳實三兩 橘皮一兩 大棗十二枚 粳米二合豉七合以水

七升先薤得五升內諸藥煮取二升分三服日作之

廣濟方療冷熱不能食及少氣調中丸方人參五兩伏

苓五兩 甘草五兩 白朮五兩 乾薑四兩 枳實以蜜和丸空

腹溫酒脹如梧子卅九日二夜不飲酒者大棗飲下

錄驗方治惡食人參湯方 人參四兩 生薑二斤厚朴二兩

枳實二兩 甘草二兩 凡五物切以水六升煮取二升分三服

集驗方治久寒胸脇逆滿不能食吳茱萸湯方吳茱

萸一升 人參一兩 生薑八兩 小麦一升 甘草一兩 桂心一兩

半夏一升 大棗枚 凡八物咀以清酒五升水三升煮

取絞去滓適寒溫飲一升日三

治上熱下冷不食方第十二

耆婆方治人上熱下冷淡飲以氣虛勞方 獨活伏苓

白朮澤瀉厚朴黃耆升麻高本紫菀 甘草人參黃芩

生薑三兩 橘皮一兩 右十四味切以水一斗煮取

半夏一升 ホソクア
大棗枚 オホナメ
擘 ハカセ
凡八物呪咀以清酒五升水三升煮

取ニキ絞ホリ去滓カレ適トク寒溫飲一升日三

治上熱下冷不食方第十二

耆婆方治人上熱下冷淡飲風氣虛勞方
獨活伏苓

白朮クハヤ澤ホカシハヤ芩ヤハシ厚トリ朴フア黃シクモ耆ヲ苁コ麻コ高コ本コ紫コ菀コ甘草カニヤクモ人ヒコ參ヒコ黃ヒコ苓ヒコ蘗ヒコ及ヒコ

生薑三兩 橘皮一兩 芍藥切以水 斗并煮取

三升去滓七升又云自飲酒上熱下冷不能食方人參湯

甘草二下升麻二兩干薑二兩粟米一合アハツ宛ルネ凡五味切以水并トリヲアシケ

煮取米去滓分三服又方平旦空腹服真酩一合即愈

又方常食粟アハクシ食イ及粟粥カシ之。又云治虛上熱下冷氣上頭アヘリ痛。

痛^リ胃煩人參湯方人參二兩
伏苓^{エホト}三兩
麥門冬^{マクモツク}一兩

粟二兩 凡四物水七升煮取四升分三服スル日三夜二ニ

又云治內虛上熱下冷氣不下頭痛胸煩頭眩

湯方
豉一升水二升一方三升令小沸內豉イシ令三沸イシ

昨有驗
僧深方策
蓮丸治
事上吟
事下熱
宿食滯

飲積滯食不消寒在胸中或又胃客食滯瘦方
十能九
 茱萸

二兩 枳一兩半 黃芩一兩 前胡一兩 細辛六分 皂莢二枚 人參

三、
伏苓一兩半
附子一兩
干薑六分
半夏一兩
凡十一物

下篩丸以蜜脹如梧子三九日三不知ヤラハカリ稍增之ヒトイヘ廣濟方療臍上

熱脾下冷日西身體熱疼^{ヒエ}不食^{ヒクヒク}不下夜卧不安方苦茶^{クチャ}
一名水塊

六分
龍膽五分
夕藥四分
黃連六分
栝樹四分

青葙子五分 ウマノコ
大黃二分 オウゴン
黃芩四分 ヒツヤキ
枳殼二分 カワナ
芒硝二分 マウソウ

特節蜜丸每食後以飲服丸如梧子十四丸日二

治穀勞歌卧方第十三

病源論云穀芽者脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣

下肺丸以蜜服如梧子三九日三不知稍增之廣濟方療臍上

熱臍下冷日西身體熱疼輒食不下夜卧不安方苦參一名水槐

六分龍膽五分一名龍胆夕藥四分黃連六分一名黃連枳殼四分一名枳殼

青蘘子五分一名蘘子大黃二分黃芩四分枳殼二分一名枳殼芒硝二分

梓節蜜丸每食後以飲服丸如梧子十四九日二

治穀勞欲卧方第十三

病源論云穀勞者脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣

否眠是也葛氏方治飽食竟便卧得穀勞病令人四

支塞也其狀令人食已則卧支體煩重而嗜眠是也

葛氏方治飽食竟便卧得穀勞病令人四支煩重且

欲卧食畢輒甚方大麥蘗一斤一名蘗枳一兩干薑三兩一名干薑枳末

照方寸匕日三四服今案范汪方大麥蘗一斤枳二升干薑三兩也又云治食過飽煩胸

俱欲卧而腹脹方散麥麵令微香枳服方寸匕得麥大

麵益佳無麵者一名麥厚可用

新錄方治穀勞食竟即目而睡方以酢二升煎杏仁

五十枚取一升服之覆取汗又方食傷飽為病胃

脹心滿者方冬胃管七枚又方十沸湯半水苦三

升飲之當吐食出

治惡方第十四

病源論云惡心者心下有停水積飲所為則心裏澹澹然

欲吐為惡心

千金方治惡心方苦瓠瓤并一升切酒漬三升煮取一升

頓服頃臍臍吐并下如瓠瓤衣三升葛氏方治人忽惡心不

已方蘗白半斤柴萸一兩一名蘗豉半升米一合棗四枚枳實二枚

塩如彈丸水三升煮取一升半分三服又方但多爵莖散

子及散賓郎一名賓郎孟詵食性惡心方取藁香葉葉

欲吐為惡心

千金方治惡心方 苦瓠ニカヒキタネ并一升切酒水三升煮取一升

煩服頃更吐并下如瓠モシオホハ瑱衣三升一名車前草葛氏方治人忽惡心不

已方ヤチ薤白半斤茱萸一兩オホアラウネ豉半升米一合棗四枚枳實二枚

塩如彈丸水三升煮取一升半分三服又方但多爵カア薑カカシ散

子及散檳榔クワ桑叶ハナハ佳孟詵食經惡心方 取懷香葉クハフオモ

煮服之新錄方治惡心方 生薑ナツメ一合皮オホ枳チ服五大兩汁

又方檳榔人未寸ル方モ生薑汁服之日二又加橘皮更佳

桂要方療冷痰氣在胸腹脹不能食吐水沫アホ嗽コソキ惡心方

吳茱萸カスハシカア并橘皮二兩杏仁三兩 生薑汁三合 右以水五升

煮取一升六合去滓內檳榔人散方寸匕分再服得一兩行

利大快三五日服一副病都除乃停亦可加厚朴三兩オホカハキ薑ナツメ

治意酢方第十五

病疸論云意酢者由上睪有停淡脾胃有宿冷故不能

消穀不消則脹滿而氣逆所以好意而吞酸氣息酸

臭 葛氏方人食畢意酢及酢心方人參二兩茱萸半

升生薑三兩大棗十二枚水五升煮取二升分再服集驗方

千金方治食後吐酢水方 干薑二兩食茱萸半升二味

酒服モ方寸匕日二立驗 醫門方療食意或酢咽方 茱萸二兩

人參二兩吳茱萸カスハシカア二兩生薑三兩大棗十二枚橘皮一兩半切以

水六升煮取二升去滓分溫二服又云療食後吐酢水食養

飯粥並作方厚朴オホカハキ 吳茱萸カスハシカア 橘皮各二 白朮三兩

右搗ツキ篩シ為散空腹酒服方寸匕甚効

廣濟方療吐酸水每食即變作酸水吐出方

檳榔人十二分人參六分伏苓八分橘皮六分畢撥

人參二兩 吳茱萸二兩 生薑三兩 大棗十二枚 橘皮一兩半 切以

水六升 煮取二升 去滓 分溫二服 又云 療食後吐酢水 食養

飯粥並作方 厚朴 吳茱萸 橘皮 白朮三兩

右搗篩為散 空腹服方寸匕 甚効

廣濟方 療吐酸水 每食即變作酸水 吐出方

檳榔人十二分 人參六分 茯苓八分 橘皮六分 畢拔

六分 搗篩為散 平晨空腹 取生薑五大兩 合皮 搗絞

取汁 溫內散方寸匕 梔調頓服之 且服漸加 至一

半 若利多 賦以炭洩為度 忌生 冷油膩 猪炙

効驗方 治食後吐酢水 洗 如酢漿 食養即劇為胃冷

干薑散方 食茱萸一兩 干薑一兩 朮一兩 甘草一兩 凡四

物 治下節用酒若湯服方寸匕 日三

治臨吐方第十六 病疸論云 臨吐者 皆由脾胃虛弱 受於風邪 所為也 若風

邪在胃 則臨吐 胃間有停飲 胃內有久寒 則臨吐 其

伏長太息 心裏澹然 或煩滿 而大便難 或溲泄 並其後故

養生方云 八月勿食被霜菜 向冬發熱 及溫之病 食飲或

心停不消 或為反胃 槌要方 療臨吐 此病有兩種 一者積

熱在胃 臨吐 遂不下食 二者積冷在胃 臨吐 遂不下食 若是積

熱在胃 臨吐 遂不下食 依合生薑根等五兩 飲服之 生薑根切一升

生麥門冬一升 青竹茹一升 生薑切五合 茯苓五兩 右切以

水八升 煮取二升半 去滓 加竹瀝六合 梔調分二服

博洛安眾方 治臨吐 遂不食方 厚朴三兩 去皮 薑人參

一兩 橘皮一兩 右水三升 煎取一升 分作三服 飯後服

僧深方 生薑湯治食也 吐逆方 生薑五兩 茯苓四兩

熱在胃。溫下。宜依合生薑根等五味飲服之。生薑根切一升。

生麥門冬一升。青竹茹一升。生薑切五合。伏苓五兩。右切以

水八升。煮取二升半。去滓。加竹瀝六合。攪調。分三服。

博洛安衆方。治溫下。不食方。厚朴三兩。去皮薑人參

一兩。橘皮一兩。右水三升。煮取一升。分作三服。飯後服。

僧深方。生薑湯。治食也。吐逆方。生薑五兩。伏苓四兩。

半。及一升。橘皮一兩。甘草二兩。五種水九升。煮取三升。七合。

分三服。廣濟方。療脾胃中冷。氣每食即逆。吐方。

人參二兩。甘草一兩半。橘皮一兩半。橘皮一兩半。

葱白三兩。生薑三兩。切以水七升。煮取二升。三合。飯去滓。分

溫三服。忌生油。臘猪鼻海藻。范汪方。半及湯。治胃中乏

氣而欲飲死方。人參二兩。伏苓二兩。生薑三兩。白蜜五合。

半。洗。凡五物以蜜肉六升。水中燒之。百過。以餘藥合

投中。煮得三升。分四服。禁食。治干飲。之用此。醫門方。治

溫下。變去。食飲不下。方。橘皮二兩。木二兩。生薑三兩。

人參二兩。甘草二兩。右切以水七升。煮取二升半。溫三服。相

去八九里。止飲。橘皮湯方。橘皮二兩。干薑二兩。人參一兩半。

以水六升。煮得二升。服七合。日三。新錄方。治溫下。食方。

錄驗方。治溫下。方。蘆根。茅根。切各一升。以水六升。煮取二升。

分三服。尊氏方。治卒溫。又厥逆方。生薑斤。切橘皮

四兩。水七升。煮取三升。遍寒。溫服一升。日三。千金方。云諸飲

減心下。堅痞。其間有水。淡眩悸者。小半。湯主之。半。

一升。生薑八兩。伏苓三兩。三味水七升。煮取二升半。二服。又云凡

飲者多食。生薑。此是飲家聖藥也。又云飲。飲吐方。生乾

湯二升。頓服即吐。又云。飲吐。吐後。心俞。百壯。又云。飲

人三服 葛氏方治卒^{ハカキ}臨^{セリ}死又厥^{ハカキ}逆方生薑斤切棗

四兩水七升煮取三升過寒溫服一升日三升千金方云諸^{ハカキ}飲

歲心下^{ハカキ}堅痞^{ハカキ}其間有水淡^{ハカキ}眩悸者小半^{ハカキ}煮湯主之半^{ハカキ}復

一升生薑八兩伏苓三兩三味水七升煮取二升半二服又云凡

飲者多食生薑此是飲家聖藥也又云飲^{ハカキ}飲^{ハカキ}方生乾

湯二升頓服即^{ハカキ}吐又云^{ハカキ}飲^{ハカキ}吐^{ハカキ}湯^{ハカキ}心俞百壯又^{ハカキ}方^{ハカキ}灸

臑俞百壯又方灸胃管百壯又方^{ハカキ}原^{ハカキ}關^{ハカキ}五十壯又方灸

胃管百壯三報又方灸脾募百壯三報

治干^{ハカキ}臨^{ハカキ}方第十七

病^{ハカキ}臣論云干^{ハカキ}臨者胃氣逆故也但^{ハカキ}臨而^{ハカキ}欲^{ハカキ}吐^{ハカキ}而無^{ハカキ}所出

故謂之干^{ハカキ}臨僧深方治胃逆乾^{ハカキ}飲^{ハカキ}吐^{ハカキ}無^{ハカキ}所去^{ハカキ}人參湯

人參二兩干薑干薑四兩澤^{ハカキ}芩^{ハカキ}二兩桂心二兩甘草二兩

伏苓四兩^{ハカキ}大黃^{ハカキ}一兩八物以水八升煮取三升服八合日三

又云^{ハカキ}茱萸湯^{ハカキ}治干^{ハカキ}飲^{ハカキ}吐^{ハカキ}涎^{ハカキ}煩^{ハカキ}心^{ハカキ}頭痛^{ハカキ}方^{ハカキ}茱萸^{ハカキ}半升

大棗十枚人參三兩生薑六兩凡四物以水六升煮取三升

五合日三服又方茱萸一升大棗十二兩以水七升煮取三升半

三服又方半夏干薑八等為散服方寸匕又方生薑

汁五合蜜四合二物先煎蜜減一合竟^{ハカキ}投^{ハカキ}薑汁^{ハカキ}復煎

數沸稍^{ハカキ}啖^{ハカキ}之勿^{ハカキ}久^{ハカキ}則口強不可啖

范汪方治卒^{ハカキ}飲^{ハカキ}煩^{ハカキ}悶^{ハカキ}方用甘蔗搗之取汁溫服一升日三

集驗方干^{ハカキ}飲^{ハカキ}或^{ハカキ}歲^{ハカキ}手足^{ハカキ}逆^{ハカキ}方^{ハカキ}橘皮^{ハカキ}四兩生薑

六兩切以水六升煮取三升服一升^{ハカキ}葛氏方治干^{ハカキ}臨

不^{ハカキ}息^{ハカキ}方^{ハカキ}梔^{ハカキ}葛^{ハカキ}根^{ハカキ}絞^{ハカキ}汁^{ハカキ}服^{ハカキ}一升許又方^{ハカキ}灸^{ハカキ}兩^{ハカキ}腕^{ハカキ}後^{ハカキ}兩^{ハカキ}筋

中^{ハカキ}先^{ハカキ}去^{ハカキ}名^{ハカキ}間^{ハカキ}使^{ハカキ}各^{ハカキ}七^{ハカキ}壯

千金方治干^{ハカキ}飲^{ハカキ}厥^{ハカキ}方^{ハカキ}飲^{ハカキ}新^{ハカキ}水^{ハカキ}三升又方煮^{ハカキ}頭

孫思邈曰一夫有以四指

爲一手夫以肌肉

理爲解

范汪方治卒欲煩悶方用甘蔗搗之取汁溫服一升三

集驗方干飲或歲手足逆冷方橘皮四兩生薑

六兩切以水六升煮取三升服一升葛氏方治干嘔

不愈方鵝葛根絞汁服一升許又方灸兩手腕後兩筋

中先夫名間使各七壯

孫思邈曰一夫有以四指爲一手夫以肌肉爲理爲解

又千金方治干飲歲厥方飲新汲水三升又方煮頭

三升飲汁又方濃煮三升蘆根飲汁又方空腹飲

生薑汁又云灸干嘔方灸心主尺澤亦佳今案明堂云在肘中上

又方灸乳下一寸廿壯

治歲方第十八

杜越反

病原論云歲者脾胃俱虛受於風邪故令新穀入

胃不能傳化故穀之氣與新舊相干胃氣則逆

胃不能傳化故穀之氣與新舊相干胃氣則逆

葛氏方治卒宛不止方飲新汲井水數升今案新

又方但向氣柝水二升又方痛臥眉中夾用氣

又方好飲二升煮取汁飲之又方枇杷葉一斤水斗

煮取三升再服又方煮蘆根今案千金方濃煮三升飲汁

又方以物刺鼻中若以少許皂莢內鼻中令嚏即止嚏

錄驗方治飲歲橘湯方生薑四兩橘皮二兩甘草兩凡三物

以水六升煮取二升一服七合日三新錄方治宛方

單服十沸湯任多少又方生薑五大兩合皮梔取汁脹

又方荻根切二升水四升煮取一升五合稍和之

又方橘皮五兩以水三升煮取一升二三服又方灸掖

下一寸又灸胃管穴蘓敬本草注治宛方千歲

薑汁雀巢錫食經暑煩爲粉和薑汁作粥食之小

醫心方卷第九